

## Zenella Med tabletki dopochwowe 14 szt.

Cena: 20,39 zł



### Opis słownikowy

Producent	NATUR PRODUKT PHARMA
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

### Opis produktu

Jako apteka internetowa oferujemy klientkom preparat Zenella Med, stworzony z myślą o kobietach aktywnych, często korzystających z sauny, basenu czy jacuzzi. Nasz sklep poleca tabletki Zenella Med szczególnie kobietom w okresie menopauzy.

#### Postać

Tabletki dopochwowe.

#### Opakowanie

1 op. 14 tabletek dopochwowych

#### Skład

Składniki aktywne:

- Inulina - 50 mg,
- Witamina C - 40 mg,
- Witamina E - 10 mg,
- Hialuronian sodu - 5 mg.

Pozostałe składniki: laktoza, stearynian magnezu.

#### Działanie

Preparat Zenella Med likwiduje przykre dolegliwości miejsc intymnych kobiet. Zapobiega infekcjom intymnym, przywraca naturalne

nawilżenie pochwy, likwiduje świąd, uczucie napięcia i pieczenie pochwy, a co najważniejsze w profilaktyce i leczeniu - stwarza warunki hamujące rozwój bakterii odpowiedzialnych za wystąpienie bakteryjnego zapalenia pochwy oraz drożdżaków z rodzaju Candida. Witamina E wraz z kwasem hialuronianowym pomaga w utrzymaniu właściwego nawilżenia pochwy, niwelując dyskomfort i zapobiegając powstaniom mikrourazów. Dodatkowo zawarta w wyrobie inulina korzystnie wpływa na rozwój naturalnej flory bakteryjnej, która pełni istotną rolę w zapobieganiu namnażaniu się bakterii wywołujących infekcje w układzie moczowo-płciowym. Działanie Zenelli MED w tabletkach jest pomocne w leczeniu stanów zapalnych pochwy, stosuje się je w terapii antybiotykowej oraz w okresie klimakterium.

### Wskazania

Dla kobiet w przypadku problemów, takich jak:

- infekcje dróg rodnych, pochwy i układu moczowo-płciowego;
- profilaktycznie w przypadku podatności na infekcje i mikrourazy, dla zachowania właściwego poziomu pH i nawilżenia pochwy;
- zmiany związane z menopauzą.

### Przeciwwskazania

Nie stosować preparatu w przypadku uczulenia na jakikolwiek składnik leku lub w przypadku uszkodzenia błony śluzowej.

### Sposób użycia

Tabletkę należy umieścić głęboko w pochwie. Przed i po aplikacji należy umyć ręce. W przypadku wspomagania leczenia bakteryjnego zapalenia pochwy:

- Stosować 1 tabletkę dopochwową raz dziennie (na noc) przez 7 do 10 dni.

Profilaktycznie:

- Stosować 1 tabletkę dopochwową dwa razy w tygodniu.

Jeśli objawy po kuracji (po 7-10 dniach stosowania preparatu) nadal się utrzymują lub stan się pogarsza, należy udać się do lekarza w celu zasięgnięcia porady medycznej.