




apteka
w sieci

Zidenac 1mg/ml krople doustne 20ml data ważności 04.2024r



Cena: 13,55 zł

Opis słownikowy

Producent	ZENTIVA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Roztwór, krople doustne

Opakowanie

20ml

Działanie

Lek **Zidenac** zawiera substancję czynną dimetyndenu maleinian. Należy on do grupy leków zwanych lekami przeciwhistaminowymi. Hamuje on działanie histaminy, substancji która uwalniana jest przez organizm podczas reakcji alergicznych.

Lek **Zidenac** łagodzi świąd i podrażnienia spowodowane wysypką skórą, zmniejsza obrzęk oraz łagodzi objawy alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, takie jak katar, kichanie, świąd nosa oraz swędzenie i łzawienie oczu.

Produkt łagodzi świąd towarzyszący chorobom zakaźnym (np. ospie wietrznej), jeśli lekarz wcześniej zdiagnozował u pacjenta te choroby lub po ukąszeniu lub użądleniu owada.

Wskazania

Leczenie objawów chorób alergicznych:



- **skóry** - pokrzywka, świąd różnego pochodzenia, wyprysk endogenny, jeżeli lekarz wcześniej zdiagnozował u pacjenta te choroby,
- **układu oddechowego** - sezonowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (katar sienny) i całoroczne zapalenie błony śluzowej nosa (np. uczulenie na kurz domowy, sierść zwierząt, pióra), jeżeli lekarz wcześniej zdiagnozował u pacjenta te choroby.

Lek **Zidenac** wskazany jest do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od ukończenia 1. roku życia. Lek wskazany jest w alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa u osób dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 6 lat i starszych.

Sposób użycia

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie przekraczać zalecanej dawki.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem. Lek **Zidenac** nie należy stosować dłużej niż 14 dni bez konsultacji z lekarzem.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat

20 do 40 kropli na dobę. Zalecana dawka u pacjentów ze skłonnością do senności to 40 kropli na noc i 20 kropli rano.

Dzieci

Dzieci w wieku 1 do 12 lat. Zalecana dobową dawką to 2 krople na kg masy ciała na dobę, podzielona na 3 dawki (np. 8 kropli 3 razy na dobę dla 2-letniego dziecka o masie ciała 12kg)

Ostrzeżenia

Leku nie należy stosować:

- jeśli pacjent ma uczulenie na dimetyndenu maleinian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

Nie należy podawać leku Zidenac niemowlętom do ukończenia pierwszego roku życia.

Uwagi

Przed rozpoczęciem stosować leku Zidenac należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli u pacjenta występuje:

- jaskra,
- zatrzymanie moczu (spowodowane np. rozrostem gruczołu krokowego),
- padaczka.

Pacjenci w podeszłym wieku powinni skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku, ponieważ istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych, takich jak przyspieszenie akcji serca, suchość w ustach, niewyraźne widzenie, zaparcia, pobudzenie lub zmęczenie.

Pacjenci w podeszłym wieku powinni zachować ostrożność podczas przyjmowania leku Zidenac. Leku nie należy stosować u pacjentów w podeszłym wieku, jeśli wykazują oznaki dezorientacji.

Skład

Lek zawiera 200mg glikolu propylenowego w pojedynczej dawce (40 kropli), co odpowiada 100 mg/ml.

Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol (23mg) sodu na dawkę (40 kropli), to znaczy lek uznaje się za "wolny od sodu".



Ten lek zawiera 2mg kwasu benzooesanowego w pojedynczej dawce (40 kropli), co odpowiada 1 mg/ml.

apteka
w sieci